

NO reproducir total o parcialmente sin autorización de ADS PHARMA S.A.S.



CIPROFLOXACINA

Ciprofloxacin de 400 mg/200 mL Solución inyectable

MEDICAMENTO PREMEZCLADO

Los medicamentos premezclados, según lo reportado en la literatura, reducen errores de medicación, son estandarizados y son más costo-efectivos, lo que representa eficiencia y seguridad del paciente, para los hospitales e instituciones de salud.

Laboratorio
ADS PHARMA S.A.S.
Cl 102 A 70 - 79 Bogotá, Colombia
Tel: (57) (1) 7450880

Registro Sanitario:
INVIMA 2016M-0016972



Bibliografía: WWW.medscape.com.co. www.drugs.com
Ficha Técnica ADS Pharma. Hanbook on injectable drugs, 17 Edition, Lawrence A. trissel.



CIPROFLOXACINA

“El agente indicado con licencia para eliminar bacterias”



Indicaciones

Se utiliza contra infecciones localizadas en tracto respiratorio, piel y tejidos blandos, tracto urinario y en general contra gérmenes sensibles a esta quinolona.

RAM

Náuseas (3 %), dolor abdominal (2 %), diarrea (2 % de adultos y 5 % de niños), aumento de los niveles de aminotransferasa (2 %), vómitos (1 % de adultos y 5 % de niños), dolor de cabeza (1 %), aumento de la creatinina sérica (1 %) y erupción cutánea (2 %).

Precauciones y/o advertencias



Evitar el uso de ciprofloxacina ADS PHARMA en pacientes que han experimentado reacciones adversas graves asociadas con fluoroquinolonas.

En terapia prolongada, realizar evaluaciones periódicas de las funciones renal, hepática y hematopoyética; ajustar la dosis en la insuficiencia renal. Suspender el uso inmediatamente si aparecen signos y síntomas de hepatitis.

Disolución y soluciones compatibles

Medicamento premezclado en 200 mL de solución compatible de dextrosa en agua destilada al 5 %.

INDICACIÓN	DOSIS ADULTO	DOSIS PEDIATRÍA
Infecciones del tracto respiratorio inferior por bacterias gram-negativas	Leve 400 mg IV cada 12 horas durante 7-14 días Grave 400 mg IV cada 8 horas durante 7-14 días	A criterio médico
Neumonía nosocomial	Leve / moderado / grave: 400 mg IV cada 8 horas durante 10-14 días	A criterio médico
Sinusitis bacteriana aguda	400 mg IV cada 12 horas durante 10 días	A criterio médico
Infecciones del tracto urinario, genital y gastrointestinal	Leve / 200 mg IV cada 12 horas durante 7-14 días Grave / 400 mg IV cada 12 horas durante 7-14 días	1 año (IV): 6-10 mg / kg cada 8 horas; dosis individual que no exceda de 400 mg durante 10-21 días
Infecciones intraabdominales	400 mg IV cada 12 horas durante 7-14 días	A criterio médico
Infecciones de la piel y tejidos blandos causadas por bacterias gram-negativas	Leve / moderado: 400 mg IV cada 12 horas durante 7-14 días. Grave / complicado: 400 mg IV cada 8 horas durante 7-14 días	A criterio médico
Infecciones óseas y articulares	Leve o moderada: 400 mg IV cada 12 horas durante 4-6 semanas. Grave / complicado: 400 mg IV cada 8 horas durante 4-6 semanas.	A criterio médico
Prostatitis bacteriana crónica	400 mg IV cada 12 horas durante 28 días	A criterio médico