

NO reproducir total o parcialmente sin autorización de ADS PHARMA S.A.S.



ZOLIDONE

Linezolid 600 mg/300 mL Solución inyectable

MEDICAMENTO PREMEZCLADO

Los medicamentos premezclados, según lo reportado en la literatura, reducen errores de medicación, son estandarizados y son más costo-efectivos, lo que representa eficiencia y seguridad del paciente, para los hospitales e instituciones de salud.

Laboratorio
ADS PHARMA S.A.S.
Cl 102 A 70 - 79 Bogotá, Colombia
Tel: (57) (1) 7450880

Registro Sanitario:
INVIMA 2017M-0012334-R1



Bibliografía: WWW.medscape.com.co www.drugs.com
Ficha Técnica ADS Pharma. Hanbook on injectable drugs, 17 Edition, Lawrence A. trissel.

ZOLIDONE

“Cuando no hay más a quien llamar, llama a Zolidone”



Indicaciones

Es efectivo en neumonía adquirida en la comunidad y en neumonía nosocomial, en infecciones complicadas de piel y tejidos blandos, incluido pie diabético; en infecciones enterocócicas resistentes a vancomicina, en infecciones estreptocócicas e infecciones por estaphylococos aureus resistentes y sensibles a meticilina.

RAM

Diarrea (10 %), dolor de cabeza (8 %), náusea (6 %) vómitos (4 %) mareos (6 %) erupción (2 %), moniliasis vaginal (1 %) y alteración del sabor (1 %).

Precauciones y/o advertencias

Hipersensibilidad. No está aprobado para usar contra bacterias gram-negativas o para infecciones relacionadas con el catéter. Considerar la suspensión en pacientes que desarrollan o tienen un empeoramiento de la mielosupresión. Puede causar hipoglucemia; controlar los niveles de glucosa en la sangre y evitar la coadministración con fármacos psiquiátricos serotoninérgicos.

Disolución y soluciones compatibles

Medicamento premezclado en 300 mL de solución compatible de dextrosa en agua destilada al 5 %, infundirlo durante 20 minutos (concentración 2 mg/mL).

INDICACIÓN

Neumonía adquirida en la comunidad y neumonía nosocomial.

Infecciones complicadas de piel y tejidos blandos, incluido pie diabético.

Infecciones enterocócicas resistentes a vancomicina.

Infecciones estreptocócicas e infecciones por estaphylococos aureus resistente y sensible a meticilina.

DOSIS ADULTO

600 mg IV cada 12 horas durante 10-14 días

600 mg IV cada 12 horas durante 10-14 días

600 mg IV cada 12 horas durante 14-28 días

600 mg IV cada 12 horas durante 10-14 días

