

NO reproducir total o parcialmente sin autorización de ADS PHARMA S.A.S.



# DEXMEDETOMIDINA

Dexmedetomidina 0,2 mg /2 mL. Solución inyectable

Laboratorio  
ADS PHARMA S.A.S.  
Cl 102 A 70 - 79 Bogotá, Colombia  
Tel: (57) (1) 7450880

Registro Sanitario:  
INVIMA 2015M -0016106



Bibliografía: [WWW.medscape.com.co](http://WWW.medscape.com.co), [www.drugs.com](http://www.drugs.com),  
Ficha Técnica ADS Pharma. Handbook on injectable drugs, 17 Edition, Lawrence A. trissel.

# DEXMEDETOMIDINA

“En situaciones complicadas lo mejor es responder conscientemente y con calma ”



## Indicaciones

Está indicado para la sedación de pacientes con y sin ventilación mecánica en unidades de cuidados intensivos, quirófanos y procedimientos diagnósticos.

## Disolución y soluciones compatibles

Diluir con 48 mL de solución compatible e infundir según indicación médica.

Soluciones compatibles:

Dextrosa al 5 %; solución salina al 0,9 % y lactato de Ringer

## Dosis

Carga:

1 mcg/kg IV durante 10 minutos. Mantenimiento 0,2-1,4 mcg/kg/h IV.

## Permite

El uso de dexmedetomidina ADS PHARMA permite:

- Mantener una sedación de ligera a moderada.
- Mejorar la capacidad de respuesta del paciente.
- Facilitar la respuesta a estímulos del paciente.
- Disminuir el tiempo de extubación y la ocupación en la UCI.

## Precauciones y/o advertencias

Administrar con precaución en pacientes con abuso y dependencia de drogas, con trastornos bradicárdicos severos preexistentes (bloqueo cardíaco avanzado) o con disfunción ventricular severa preexistente, insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia cardíaca.

## RAM

Hipotensión (28 %) 1-10 %: anemia, bradicardia, fiebre, derrame pleural, leucocitosis y edema pulmonar.

## Seguridad

La dexmedetomidina de ADS PHARMA no causa depresión respiratoria.

